


# ■ 日本腦炎 在學校的預防和控制

- 衛生局疾病預防控制中心
  - 2008年7月





- 日本腦炎其他名稱:流行性乙型腦炎
- 是由乙型腦炎病毒經蚊蟲叮咬引起的以腦實質炎症為主要病變的急性傳染病



## 疾病特點

---

- 多見於兒童
- 高熱
- 意識障礙、驚厥或抽搐、病理反射及腦膜刺激征
- 重症者伴有呼吸衰竭,病死率高達**20%~50%**
- 可留有嚴重後遺症
- 沒有有效的專門治療方法



## 疾病特點

---

- 傳染源 主要是豬
- 傳播途徑主要是 三帶喙庫蚊
- 疾病潛伏期**4~21**天，一般為**10~14**天
- 外潛伏期**10~12**天




## 流行地區

---

- 主要在亞洲及西太平洋的鄉村及農業地域
- 中國、日本及韓國等，高危期間為四月至九月。
- 在北印度及尼泊爾，高危期則為六月至十一月。
- 在亞洲及大洋洲的熱帶地區，全年皆有危險

# 日本腦炎 2003年世界分佈圖





# 本澳情況

---

發病情況：2002年1例

傳染源

傳播途徑

非常規防疫接種

接種指針：

\*將前往流行區農村地區停留超過7天的12月齡以上至15歲以下兒童

\*將前往流行地區居住的12月齡以上至15歲以下兒童

# 預防 *Prophylaxis*



---

- 疾病申報
- 控蚊
- 防蚊