



澳門特別行政區政府  
Governo da Região Administrativa Especial de Macau  
衛生局  
Serviços de Saúde

## 颱風後教育機構的傳染病預防指引

2018.09.24 更新

為有效預防颱風後可能引起之傳染病，衛生局建議教育機構應採取下列措施：

### 1. 檢視環境安全

- 1.1 教育機構應於颱風後主動檢查機構的內外環境，清理如鐵釘、玻璃碎片等尖銳物及其他雜物，以免傷及學生和教職人員。
- 1.2 清理環境時，工作人員應穿著適當的鞋並戴上勞工手套，避免被尖銳物刺傷或割傷，以防感染破傷風等傳染病。

### 2. 妥善處理傷口

- 2.1 如出現輕微損傷，應即時用肥皂及清水沖洗傷口，塗上消炎藥膏後妥善包紮。
- 2.2 如受傷嚴重或有疑問時，應立即就醫，醫生將因應情況為傷者注射預防破傷風疫苗。
- 2.3 為別人處理傷口時，避免徒手接觸傷口或直接接觸血液，應戴上一次性手套，以防感染乙型肝炎等血液傳播疾病。

### 3. 清除污物，清潔消毒環境

- 3.1 個人保護裝備：進行清潔消毒時，應穿戴口罩、手套和膠鞋，穿著一次性圍裙。
- 3.2 遵循「清除、清潔、消毒」三步驟，處理環境及設備的衛生：
  - 3.2.1 **清除**：積水退去或抽走後，先穿戴好手套等保護裝備，將易腐敗物件和污泥清除；
  - 3.2.2 **清潔**：地面、牆壁、扶手等表面及傢俱等，宜先用清潔劑清洗，再用清水沖洗；
  - 3.2.3 **消毒**：
    - 餐具架及餐具：以煮沸處理；若不能煮沸處理的，用 1:100 漂白水稀釋液浸泡約 30 分鐘消毒，其後再用清水沖洗潔淨；
    - 桌面、教具、玩具等：以清潔劑清洗後，再用 1:100 漂白水稀釋液消毒，再以清水沖洗潔淨；
    - 曾被污水浸泡過的衣物、床上用品等：可在清洗前先用 1:100 漂白水稀釋液浸泡約 30 分鐘消毒後再常規清洗。



### 稀釋漂白水的調配及注意事項：

- 調配及使用漂白水時，應穿戴手套等防護裝備；在通風環境下小心操作，避免直接接觸眼睛及皮膚，如不慎觸及，應即用大量清水沖洗；漂白水不可與其他清潔劑一併使用；
- 將家用漂白水加入自來水中進行配製；
- 按漂白水含 5%有效氯計算：

漂白水稀釋倍數	漂白水量	清水量
1:50	100 毫升	5 公升 (約半桶水)
1:100	(約半個水杯的量)	10 公升 (約 1 桶水)

- 如採用有效氯含量不等於 5%的漂白水，應參照產品說明進行稀釋。

## 4. 清除孳生源，加倍注意防蚊

- 4.1 颱風過後會有大量積水，容易孳生蚊子；無論是戶內或戶外，學生和教職工都應加倍注意使用防蚊劑、紗窗等各項防蚊措施。
- 4.2 教育機構應於颱風後主動巡視機構的內外環境，清理排水道及溝渠，填平可積水的低地及修整草叢，蓋好污水坑和蓄水池，清除戶內及戶外孳生源，如帆布、膠樽、盆栽底盤等，降低病媒蚊的密度，減少登革熱病毒的傳播風險。

## 5. 妥善處理食物

- 5.1 由於部份低窪地區出現水浸和停電，應提醒學生和教職工切勿食用被污水浸泡或在不適當溫度存放過久的食物，教育機構亦應慎重選擇衛生狀況良好的有牌食肆供應餐飲。
- 5.2 倘工作人員出現呼吸道、胃腸道等疾病，應即就醫，並暫時不參與處理食物之工作。
- 5.3 提醒學生和教職工處理食物前、便後和飲食前應以正確方法洗手。

## 6. 及早就醫，及早通報

- 6.1 提醒學生和教職工加倍注意個人健康；如出現腹痛、腹瀉、發熱等症狀，應儘早就醫，並主動告知醫生相關的餐飲史及接觸史，以利醫生診治，並及早發現傳染病暴發的情況。
- 6.2 教育機構應於颱風後加強對學生和教職工缺勤及疾狀之監測，如出現異常，應儘早通報衛生局疾病預防控制中心。

如對本指引有任何疑問，可致電 28 700 800 查詢